

Descriptions de genres nouveaux

ET

d'espèces nouvelles

DE

Coléoptères de la famille des Bostrychides (1)

Par P. LESNE.

Stenomera assyria, n. sp. — Long. 6 mill. — Très voisin de *S. Blanchardi* Luc. Dessus du corps moins fortement ponctué. Pronotum moins convexe, légèrement tridéprimé longitudinalement en arrière. Écusson convexe. — Mésopotamie (coll. E. Abeille de Perrin).

Heteropsoa, n. g. — Voisin de *Stenomera* Luc. En diffère par les tarses pentamères et les éperons terminaux internes des tibias antérieurs inégaux.

Heteropsoa australis, n. sp. (♀). — Long. 10—11 mill. — Allongé, parallèle, d'un bleu métallique obscur avec le métasternum, l'abdomen et les appendices ferrugineux. Dessus du corps fortement et densément ponctué. Prothorax subglobuleux, régulièrement convexe, très régulièrement arrondi sur les côtés et en arrière, tronqué au bord antérieur; propleures granulés. — Colonie du Cap (Muséum de Paris: coll. L. Bedel).

Heterarthron (2) **parvidens**, n. sp. (♀). — Long. 12 1/2 mill. — Voisin de *H. gracilipes* Blanch. Plus large. Brun. Bord antérieur de l'épistome muni en son milieu d'une très petite dent caréniforme; pilosité clypéale courte, ne masquant pas le tégument. Élytres densément granulés; carène longitudinale très brièvement prolongée sur la déclivité postérieure; celle-ci bordée latéralement par une carène lisse. Antennes de dix articles. — Brésil: Province de Bahia (coll. E. Gounelle).

Dinoderus speculifer, n. sp. — Long. 1/2 mill. — Un peu allongé. Brun. Suture latérale prothoracique reliée en avant à la première rangée de dents de la râpe. Ponctuation élytrale forte, confluyente en arrière; déclivité postérieure des élytres présentant une surface circulaire très

(1) En attendant la publication d'un travail d'ensemble, dont le 1^{er} mémoire a été déposé sur le bureau de la Société, je crois devoir publier des maintenant ces quelques descriptions sommaires d'espèces nouvelles.

(2) Le genre *Heterarthron* Guér. doit être rétabli; il comprend les *Polycaon* à corps cylindrique et les *Exopioides*.

lisse et très brillante, diamétralement divisée par la suture. — Japon (Muséum de Paris).

Dinoderus japonicus, n. sp. — Long. 3 3/4 mill. — Oblong. Brun foncé. Épistome et front hérissés d'assez longs poils fauves. Suture latérale prothoracique indistincte en avant. Aire postérieure du pronotum fortement et ocellairement ponctuée sur les côtés, à fovéoles médianes nulles. Écusson à peine transversal. Déclivité élytrale sans surface lisse, à ponctuation peu profonde, non confluyente. — Japon (Muséum de Paris).

Dinoderus pilifrons, n. sp. — Long. 3 1/3—3 3/4 mill. — Oblong. Brun roussâtre. Voisin de *D. japonicus* Lesne. En diffère par la ponctuation très fine et non ocellée des côtés de l'aire postérieure du pronotum, par l'écusson nettement transversal et par la ponctuation très forte, confluyente et aréolaire de l'extrémité des élytres. — Hindoustan (Muséum de Paris; coll. L. Fairmaire).

Dinoderus perpunctatus, n. sp. — Long. 2 1/2—3 mill. — Un peu allongé. Brun. Voisin de *D. minutus* Fabr. En diffère par sa forme plus étroite, par les dents assez nombreuses, contiguës et très peu saillantes de la rangée antérieure de la râpe prothoracique et par la ponctuation très forte, confluyente et aréolaire des parties postérieures des élytres. — Subcosmopolite dans les régions chaudes (Muséum de Paris; Musée de Bruxelles; coll. L. Bedel; coll. L. Fairmaire; coll. E. Fleutiaux).

Bostrychus elongatus, n. sp. — Long. 10 mill. — Allongé, très régulièrement parallèle. Brun foncé. Voisin des *B. fossulatus* Blanch. et *angustus* Steinh. Diffère de ces espèces par ses palpes maxillaires plus allongés, par son prothorax arrondi et nullement tronqué en avant, avec les deux dents médianes de la rangée antérieure de la râpe plus développées que les latérales. Prosternum prolongé en pointe aiguë entre les hauches. Élytres très fortement et sérialelement ponctués; déclivité postérieure dépourvue de gibbosités, régulièrement arrondie, légèrement convexe, fortement ponctuée et granulée, avec la suture élevée et un rebord inférieur en demi-cercle. Éperon terminal interne des tibias antérieurs droit. — Tonkin (Dr Langue) (Muséum de Paris).

Cette espèce rappelle beaucoup les *Stephanopachys*, mais ses tarses sont ceux des *Bostrychus*.

Bostrychus granulifrons, n. sp. — Long. 8 1/3—9 mill. — Très voisin de *B. angustus* Steinh. En diffère par la suture fronto-clypéale indistincte, par les granules arrondis, lisses et brillants que présente le

tégument frontal outre sa sculpture foncière, par l'absence de calus à la déclivité élytrale dont la surface, entièrement granulée, ne montre pas d'intervalles brillants, enfin par la suture élytrale peu élevée sur la déclivité. — Brésil (provinces de Pernambuco, de Bahia et de Rio-Janeiro) (Musée de Bruxelles; coll. R. Oberthür; coll. E. Gounelle).

Bostrychus Fairmairei, n. sp. — Long. 11 mill. — Très voisin des *B. pulvinatus* Blanch. et *mystax* Blanch. En diffère par la déclivité élytrale munie de chaque côté de trois tubercules spiniformes. Bord antérieur du pronotum inerme sur presque toute sa longueur, présentant seulement une ou deux épines redressées, de chaque côté, à ses extrémités. Pubescence et pilosité analogues à celles de *B. pulvinatus*, mais moins abondantes. — Chili septentrional : Tacna (coll. L. Fairmaire).

Bostrychus penicillatus, n. sp. — Long. 12 1/2 mill. — Assez allongé. Brun grisâtre. Voisin de *B. verrucosus* Gorb.; s'en distingue notamment par son système pileux tout différent et bien plus développé. Ce système pileux se compose : 1° de poils assez longs, d'un roux ardent à la base, argentés au sommet, qui, sur les parties discoïdales du pronotum et des élytres, sont groupés en pinceaux plus ou moins couchés sur le tégument, tandis que, sur les côtés du corps, ces poils sont dressés et non groupés; 2° de poils entièrement bruns, beaucoup plus longs que les précédents, dressés perpendiculairement en touffes pénicillées sur la moitié antérieure du pronotum et sur les élytres. Trois de ces derniers pinceaux pileux, bien plus développés que les autres, se dressent sur le trajet de la nervure élytrale 5. Antennes noires avec les articles 2 à 5 roussâtres. Bord apical des élytres longuement pubescent, arrondi, inerme. — Mexique (M. Giesbreght) (Muséum de Paris).

Bostrychus iniquus, n. sp. — Long. 8 1/2 mill. — Corps assez court et élargi en arrière comme chez *B. plicatus* Guér. Brun grisâtre mat, un peu verdâtre. Pubescence des téguments dorsaux inégalement répartie, formée de poils blonds extrêmement courts et très fins, couchés. Suture fronto-clypéale en arc de cercle. Échancrure antérieure du prothorax peu profonde, arrondie. Surface des élytres inégale, présentant comme de petites boursoufflures irrégulières. Carènes longitudinales antérieures des élytres courtes et élevées, suivies chacune d'une dépression subcirculaire glabre et mate, perforée de gros points enfoncés. Une seconde dépression semblable à la précédente, mais un peu allongée, est située plus en arrière et précède sur chaque élytre le tubercule supérieur de la déclivité. Tubercules du bord supérieur de la déclivité,

au nombre de quatre, ayant la forme de bosses assez régulièrement arrondies; leur surface est finement granulée et pubescente comme celle des élytres. Épaules légèrement bianguleuses en dehors. — Haut-Ogooué (L. Guiral) (Muséum de Paris).

Bostrychus fasciatus, n. sp. — Long. 10—16 mill. — Assez allongé, très convexe. Voisin de *B. plicatus* Guér. S'en distingue par sa taille plus grande, sa forme encore plus convexe mais peu élargie en arrière, son prothorax plus développé, fortement arrondi sur les côtés, par sa coloration plus foncée et par la déclivité élytrale dépourvue de tubercules costiformes très saillants. Dessus du corps noir, orné d'une pubescence grisâtre inégalement répartie, éparses sur la majeure partie du pronotum et des élytres, mais formant sur le premier, de chaque côté, une tache latéro-postérieure allongée, et, sur les seconds : 1° une tache antérieure commune au niveau de l'endroit où les carènes élytrales font un angle sortant; 2° une fascie postérieure en zigzag précédant la déclivité et occupant toute la largeur des élytres. Taches pileuses dorées des articles de la massue antennaire larges, très rapprochées, occupant presque toute la largeur des articles. Côtés du prothorax sinués en arrière; gibbosités discoïdales du pronotum larges, peu saillantes. Carènes élytrales peu élevées. Épaules non denticulées en dehors. — Brésil (Muséum de Paris; coll. L. Bedel).

Bostrychus Bedeli, n. sp. — Long. 12 1/2—13 mill. — Allongé, parallèle, d'un brun grisâtre et jaunâtre. Très voisin des *B. plicatus* Guér. et *fasciatus* Lesne. Dessus du corps couvert d'une pubescence jaunâtre courte et dense, assez uniforme. Taches pileuses de la massue antennaire grandes, un peu moins développées que chez *B. fasciatus*. Côtés du prothorax droits en arrière, non sinués avant les angles postérieurs; gibbosités discoïdales du pronotum non caréniformes. Élytres avec une série dorsale principale de tubercules, série formant un sinus sortant dans la partie antérieure; déclivité postérieure bordée supérieurement et latéralement de six tubercules costiformes très élevés; rebord inférieur de la déclivité brièvement réfléchi en dessus sur les côtés; lobe apico-sutural des élytres rectangulairement tronqué. — Colombie (Muséum de Paris; coll. L. Bedel).

Bostrychus caudatus, n. sp. — Long. 10 1/2—14 mill. — Assez voisin de *B. plicatus* Guér., mais plus allongé, parallèle. D'un roux grisâtre terreux. Sillon fronto-clypéal large et profond. Prothorax bigibbeux en dessus, étroitement échancré en avant. Carènes longitudinales antérieures des élytres élevées, suivies chacune d'une série linéaire de tubercules, série d'abord angulée en dehors, puis conver-

geant graduellement en arrière avec son homologue; déclivité postérieure bordée de chaque côté, en dessus, de trois tubercules pubescents, arrondis, dont l'interne est le plus gros et l'externe le plus petit; angle apico-sutural prolongé en une large pointe mousse, glabre, noire. Pubescence abdominale roux doré, très finement mouchetée de noir. — Sénégal, Guinée, Gabon (Muséum de Paris; coll. L. Fairmaire; coll. L. Bedel).

Bostrychus spectabilis, n. sp. — Long. 15 1/2 mill. — Allongé, graduellement élargi en arrière. Noir bleuâtre mat, plombé. Assez voisin de *B. bicornis* Web. Suture fronto-clypéale droite. Bord antérieur de l'épistome frangé de chaque côté de poils noirs. Échanerure antérieure du prothorax large, rectangulaire. Disque du pronotum avec deux petites fossettes rapprochées, arrondies, peu enfoncées. Écusson saillant, inégal. Tubercules juxta-scutellaires très saillants, dentiformes. Élytres mats, ponctués de gros points allongés et ornés dorsalement d'un réticulum irrégulier et discontinu de côtes saillantes à sommet lisse et brillant. Ces côtes présentent des poils très courts, peu abondants, d'un roux ardent. Déclivité élytrale très fortement ponctuée, munie de chaque côté supérieurement d'un tubercule costiforme; rebord inférieur brièvement incurvé en dessus latéralement. Suture peu saillante sur la déclivité. Pubescence des pattes noire. — Californie (coll. R. Oberthür).

Bostrychus uncipennis, n. sp. — Long. 7—11 mill. — Un peu allongé, parallèle. Brun brillant, glabre en dessus. Très voisin de *B. æqualis* Wath. Angles postérieurs du prothorax pointus. — ♂. Prothorax plus grand que chez la ♀. Ponctuation de l'aire postérieure du pronotum forte et dense sur les côtés, rare sur le milieu qui est recouvert d'écaillés brillantes un peu allongées. Déclivité postérieure des élytres présentant dans sa partie supérieure quatre côtes dont les externes sont simples et les internes terminées par un fort crochet recourbé en dessus et en avant. — ♀. Aire postérieure du pronotum très fortement ponctuée sur presque toute son étendue. Élytres inermes. — Indo-Chine, Insulinde, Hindoustan septentrional, îles Andaman, îles Mariannes, Madagascar (Muséum de Paris; Musée de Bruxelles; coll. L. Bedel; coll. L. Fairmaire, etc.).

Bostrychus hamatipennis, n. sp. — Long. 11—14 mill. — Oblong, un peu allongé. Brun. Corps un peu plus court que chez *B. cephalotes* Ol. Tête grosse comme dans cette dernière espèce. Bord antérieur du prothorax légèrement réfléchi; angles postérieurs presque toujours droits, pointus. Ponctuation élytrale forte et dense. Tégument offrant une pubescence rousse extrêmement courte et assez éparse sauf sur l'épistome et,

chez le mâle, sur la déclivité postérieure des élytres. Celle-ci est munie supérieurement de deux fortes apophyses latérales cylindriques, tronquées au bout et pointues en dedans (♂) ou de deux petits callus latéraux (♀). — Indo-Chine, Hindoustan septentrional, Chine, Palawan, Madagascar (Muséum de Paris; coll. L. Fairmaire; coll. L. Bedel; coll. Ch. Alluaud; coll. Ed. Fleutiaux).

Bostrychus parallelus, n. sp. — Long. 9—13 mill. — Allongé, parallèle. Noir brillant. Très voisin de *B. cephalotes* Ol. En diffère par sa forme plus étroite, par la ponctuation dorsale des élytres bien plus forte, moins serrée, disposée en séries striales assez régulières. — ♂. Déclivité postérieure des élytres moins fortement ponctuée que chez *B. cephalotes*. — ♀. Front non gibbeux; déclivité élytrale sans côtes saillantes ni rebord inféro-latéral. — Indo-Chine, Hindoustan, Formose, Sumatra, Philippines (Muséum de Paris; Musée de Bruxelles; coll. L. Bedel).

Bostrychus bengalensis, n. sp. — Long. 10 1/2—13 mill. — Assez allongé, parallèle. Brun, brillant sur les élytres. Voisin de *B. cephalotes* Ol. et surtout de *B. parallelus* Lesne. Front et épistome simples, très convexes. Prothorax notablement rétréci en avant, ses angles antérieurs prolongés et terminés par une dent uncinée; région des angles postérieurs du pronotum granulée. Ponctuation élytrale forte, disposée en séries striales assez régulières, comme chez *B. parallelus* ♀. Déclivité postérieure des élytres sans côtes saillantes ni carènes latérales, lisse et brillante sur le tiers inférieur; bord apical des élytres non épaissi. — Bengale (Muséum de Paris; Musée de Bruxelles).

Bostrychus laminifer, n. sp. — Long. 9—11 mill. — Oblong. Noir brillant. Assez voisin de *B. uncinatus* Germ. Front surmonté d'une lame transversale saillante très élevée, à tranche apicale élargie, mate. Angles postérieurs du prothorax droits, pointus. Aire postérieure du pronotum écailleuse au milieu. Ponctuation élytrale forte et dense. — ♂. Lame frontale occupant à peine la moitié de la largeur de la tête. Angles antérieurs du prothorax munis d'une dent uncinée. Déclivité postérieure des élytres éparsément et peu fortement ponctuée. — ♀. Lame frontale de la largeur de la tête. Angles antérieurs du prothorax sans crochet. Déclivité postérieure des élytres très fortement et densément ponctuée. — Brésil: Province de Bahia (E. Gounelle); République Argentine: Corrientes (A. d'Orbigny) (Muséum de Paris; coll. E. Gounelle).

Bostrychus cænophradoïdes, n. sp. — Long. 12 1/2—18 mill. — Oblong (♂), allongé (♀). Noir brillant. Faciès de *Cænophrada anobioides* Waterh. Prothorax rétréci en avant, ses angles postérieurs arrondis. Élytres très fortement ponctués. Pubescence abdominale uniforme.

— ♂. Suture fronto-clypéale bien distincte au milieu. Front sans côte transversale ni tubercule saillant. Angles antérieurs du prothorax prolongés en avant, ces prolongements infléchis, terminés en crochet. Déclivité postérieure des élytres concave, présentant supérieurement quatre dents mousses costiformes dont les inférieures sont plus développées; ponctuation de la déclivité s'étendant à toute la surface de celle-ci, moins forte que la ponctuation des parties dorsales. — ♀. Prothorax sans prolongements antérieurs. Déclivité élytrale sans tubercules. Très semblable à *Cænophrada anobioides* ♀, dont elle diffère notamment par ses antennes de forme normale, par la présence d'une côte transversale au bord antérieur du front et par le feutrage couché, roux doré, qui garnit le bord antérieur du pronotum. — Indo-Chine, Hindoustan, Sumatra (Muséum de Paris; Musée de Bruxelles; coll. L. Bedel; coll. L. Fairmaire).

Bostrychus vestitus, n. sp. — Long. 9—11 1/2 mill. — Court, robuste, très convexe. Brun varié de gris. Bord antérieur de l'épistome étroit, plus ou moins profondément échancré en arc de cercle. Suture fronto-clypéale presque droite. Front simple. Labre moins de deux fois aussi large que long, frangé de poils roux doré au bord antérieur. Prothorax transversal, légèrement échancré au bord antérieur, mais non prolongé aux angles correspondants, arrondi aux angles postérieurs, transversalement convexe sur le disque. Aire postérieure du pronotum finement aréolée au milieu. Élytres simples, sans côtes ni tubercules, fortement et densément ponctués, à pubescence grisâtre, groupée en petites taches confluentes, irrégulières; déclivité postérieure simple, convexe, avec la suture peu saillante; élytres régulièrement arrondis conjointement au bout. Tibias sans poils dressés. — République Argentine (Muséum de Paris; Musée de Bruxelles; coll. L. Fairmaire).

Sinoxylon capillatum, n. sp. — Long. 5 mill. — Oblong. Brun foncé. Dents frontales peu distinctes. Aire postérieure du pronotum présentant au milieu des granules denses, arrondis. Ponctuation élytrale très forte, confluyente en arrière; pubescence élytrale formée de poils couchés assez longs et très fins, peu denses. Déclivité postérieure un peu concave, avec les épines suturales aiguës, très rapprochées, comprimées latéralement, insérées sur la suture même, au milieu de la hauteur de la déclivité. — Kashmir (coll. L. Fairmaire).

Sinoxylon japonicum, n. sp. — Long. 5 1/3—6 mill. — Un peu allongé, parallèle. Tête et prothorax noirs, élytres brun roussâtre. Front inerme. Granules du milieu de l'aire postérieure du pronotum non allongés, assez écartés. Ponctuation élytrale forte, rugueuse; pubes-

cence élytrale éparse, formée de fins poils roux doré assez longs, couchés. Bord supérieur de la déclivité postérieure avec trois faibles callosités costiformes de chaque côté. Épines subsuturales de la déclivité écartées de la suture, subcylindriques, mousses à l'extrémité. — Japon (Muséum de Paris).

Sinoxylon villosum, n. sp. — Long. 4 1/2 mill. — Oblong. Brun foncé; élytres roussâtres à la base; pattes et antennes rousses. Front inerme. Granules du milieu de l'aire postérieure du pronotum très fins, allongés, denses. Élytres très fortement et irrégulièrement ponctués en arrière, présentant des poils dorés, assez longs, couchés. Épines subsuturales assez écartées, nullement aplaties, pointues au bout. Déclivité présentant inférieurement un pli oblique, comme chez l'espèce suivante. — Afrique australe-orientale (Muséum de Paris).

Sinoxylon transvaalense, n. sp. — Long. 5 mill. — Oblong. Noir. Dents frontales très petites. Granules du milieu de l'aire postérieure du pronotum assez denses, nettement allongés, mais non aciculaires; sur les côtés, ces granules deviennent moins denses, sont plus petits et arrondis. Ponctuation élytrale forte, confluyente et irrégulière en arrière. Déclivité postérieure non délimitée par une côte circulaire, fortement ponctuée de gros points arrondis, réguliers, faisant défaut dans le quart inférieur. Cette région inférieure brillante et presque lisse de la déclivité présente un pli transversal épais, oblique, qui part du bord latéro-inférieur de la déclivité et aboutit à l'angle apico-sutural des élytres. Dents subsuturales nettement aplaties, non adjacentes, sans carènes attenantes, insérées un peu au-dessus du milieu de la déclivité. — Transvaal : Pretoria (coll. E. Simon).

Sinoxylon sudanicum, n. sp. — Long. 4 mill. — Voisin de *S. bicuspidatum* Anc., mais plus petit. En diffère par les granules du milieu de l'aire postérieure du pronotum plus fins, plus serrés, allongés, presque aciculaires; par les poils blonds très fins des élytres, par les épines subsuturales très aplaties, à base élargie et prolongée en avant et en arrière par de petites carènes accompagnant la suture. — Soudan (coll. L. Fairmaire).

Sinoxylon succisum, n. sp. — Long. 3 3/4—4 mill. — Oblong, court. Brunâtre avec la partie antérieure des élytres, les antennes et les pattes rousses ou ferrugineuses. Front quadridenté. Granules du milieu de l'aire postérieure du pronotum très fins, à peine allongés, assez denses. Ponctuation élytrale forte, surtout dans la partie supérieure de la déclivité postérieure. Celle-ci est dépourvue de callus latéraux et est impunctuée dans son quart inférieur. Épines subsuturales à peine com-

primées, sans carènes attenantes, très pointues, insérées vers le milieu de la hauteur de la déclivité. — Sénégal (Muséum de Paris; coll. L. Fairmaire).

Sinoxylon Marseuli, n. sp. — Long. 4—4 1/2 mill. — Court, un peu élargi en arrière. Brun; base des élytres roussâtre. Voisin de *S. ruficorne* Fabr. Dents frontales petites. Granules du milieu de l'aire postérieure du pronotum très fins, à peine allongés, très denses. Élytres brillants, glabres, très fortement ponctués en arrière; déclivité postérieure bordée supérieurement et latéralement par de petits callus, assez fortement mais éparsément ponctuée dans sa moitié supérieure, presque complètement lisse dans sa moitié inférieure. Épines subsuturales non contiguës, comprimées, prolongées supérieurement par une fine côte longitudinale, insérées au milieu de la hauteur de la déclivité. — Célèbes : Makassar (Muséum de Paris).

Sinoxylon Brazzai, n. sp. — Long. 7 mill. — Très court, large. Brun foncé. Dents frontales longues, saillantes, surtout les médianes. Milieu de l'aire postérieure du pronotum couvert de granules saillants, fins, très denses, arrondis. Ponctuation élytrale forte en avant et en arrière. Déclivité postérieure à double ponctuation, sans espace inférieur lisse, velue de poils dressés très courts et denses, avec trois callus de chaque côté à son bord supérieur. Épines subsuturales écartées de la suture, nullement comprimées, légèrement réfléchies en dessus au sommet, terminées en pointe. — Congo : Franceville (S. de Brazza) (Muséum de Paris).

Xylopertha simplicipennis, n. sp. — Long. 3 1/2 mill. — Parallèle, assez allongé. Noir; élytres bruns, roussâtres à la base; antennes et tarses roux. Appartient au groupe de *X. dinoderoides* Horn. Antennes de dix articles. Tête très finement granuleuse. Angles antérieurs du prothorax armés d'une dent dressée. Aire postérieure du pronotum assez fortement et densément ponctuée au milieu sans trace de sillon médian. Élytres fortement et densément ponctués, leur ponctuation double; déclivité postérieure ponctuée de la même façon que le reste des élytres. Pubescence élytrale formée de poils dorés très fins, clairsemés, couchés, sauf sur la déclivité postérieure où ils sont dressés. Pas de callus subterminaux ni de différenciations de la suture et du bord apical. — Tonkin (D^r Langue) (Muséum de Paris).

Xylopertha plurispinis, n. sp. — Long. 5 1/2—6 1/2 mill. — Oblong, parallèle. Tête et pronotum noirs; élytres roux à la base, bruns

en arrière; abdomen roux; antennes et pattes rousses avec les cuisses plus claires et les tibias antérieurs bruns. Antennes de dix articles, à massue normale. Front simple, faiblement velu de poils roux. Prothorax subcarré, arrondi aux angles, sans trace de rebord latéral. Aire postérieure du pronotum très lisse et brillante sur les côtés, très finement et éparsément ponctuée au milieu. Ponctuation élytrale fine en avant, très forte mais non confluyente en arrière. Déclivité postérieure fortement mais non très densément ponctuée, finement et densément pubescente, présentant de chaque côté : 1° sur ses bords supérieur et latéraux, trois épines augmentant graduellement en grandeur vers le bas et dont les deux supérieures sont costiformes; 2° au bord inférieur, une apophyse apico-suturale redressée parallèlement à l'axe du corps de l'insecte et précédée extérieurement d'une profonde échancrure; 3° une épine subsuturale rapprochée de son homologue, conique, insérée au-dessus du milieu de la déclivité. — Afrique orientale et australe : Zanguebar (coll. R. Oberthür); Transvaal : Makapan (coll. E. Simon).

Phonapate, n. g. — Voisin du genre *Apate* Fabr. En diffère surtout par l'épistome échancré en avant au lieu d'être denté et par la présence d'organes stridulants chez la femelle. Ces organes se composent, d'une part, d'une série de crêtes parallèles, courtes, assez fortes, mais peu nombreuses, situées latéralement en dessous de la région des angles postérieurs du prothorax et, d'autre part, d'une aire à striation excessivement fine, occupant, sur la cuisse antérieure, la face antérieure du genou.

Type : *Apate frontalis* Fabr.

Apate laticornis, n. sp. — Long. 8—9 mill. — Allongé, régulièrement parallèle. Brun roussâtre ou roux; antennes, palpes et cuisses roux. Voisin des *Apate coronata* Mars., *cornifrons* Baud. et *rufocoronata* Fairm. Prothorax non ou à peine élargi en arrière. Aire postérieure du pronotum couverte de granules très fins, denses. Élytres fortement, densément et uniformément ponctués, sans nervures apparentes, hérissés de longues soies dressées; déclivité postérieure simple, régulièrement arrondie. — ♂. Prolongements uncinés des angles antérieurs du prothorax dirigés en dessous et atteignant le milieu des yeux. Vertex légèrement sillonné longitudinalement. — ♀. Cornes frontales dilatées transversalement, très larges, rapprochées en dedans à leur base, tronquées un peu obliquement au sommet et donnant insertion sur leur face ventrale à de longues soies dorées, incurvées en dessous. — Obock (M. Maindron); Abyssinie (A. Raffray) (Muséum de Paris; coll. R. Oberthür).